

## NOMBRES COMPLEXES (II)

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ .

### O. Équations trigonométriques

Exercice 1 : Résoudre dans  $]-\pi; \pi]$ , les équations suivantes :


a)  $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$       b)  $\sin x = -\frac{1}{2}$ .

Exercice 2 :

Résoudre dans  $]-\pi; \pi]$ , le système d'équations  $\begin{cases} \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases}$

Exercice 3 :

Le système d'équations  $\begin{cases} \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases}$  a-t-il des solutions dans  $\mathbf{R}$  ?



### I. Module et arguments



Exercice 4 : Placer dans la figure ci-contre les points suivants :

A d'affixe  $a$  tel que  $|a| = 2$  et  $\arg(a) = \frac{\pi}{3}$  ;

B d'affixe  $b$  tel que  $|b| = \frac{3}{2}$  et  $\arg(b) = -\frac{\pi}{4}$  ;

C d'affixe  $c$  tel que  $|c| = 2,5$  et  $\arg(c) = \frac{4\pi}{3}$  .


Exercice 5 :



On a placé dans la figure ci-contre, les points A, B, C, D, E, F, G et H d'affixes respectives  $a, b, c, d, e, f, g$  et  $h$ . Lire le module et donner un argument pour chacune de ces affixes.

Exercice 6 :


Dans la figure ci-contre, déterminer le module et un argument des affixes des points A, B, C, D et E.



Exercice 7 :

On donne la figure ci-dessous. Compléter le tableau suivant par « vrai » ou « faux » en donnant le cas échéant les bonnes valeurs des modules ou arguments.

Point	Module	Argument	Vrai-Faux ?
A	3	$\frac{\pi}{6}$	
B	2	$\frac{13\pi}{2}$	
C	2,5	$\frac{2\pi}{3}$	
D	-1	$\frac{\pi}{4}$	
E	2	$-\pi$	
F	2	$\frac{11\pi}{6}$	
G	1	$-\frac{21\pi}{4}$	
H	-3	$-\frac{11\pi}{6}$	
I	2	$\frac{10\pi}{3}$	
J	2,5	$\frac{\pi}{2}$	



Exercice 8 : Indiquer le module et un argument des nombres suivants :

- a)  $2 \left[ \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) \right]$     b)  $2i$     c)  $-3i$     d)  $1$     e)  $-2$

Exercice 9 : Déterminer le module et un argument des nombres complexes

$a = 1 + i\sqrt{3}$ ,  $b = 1 - i$ ,  $c = \sqrt{3} + i$  et  $d = \sqrt{3} - i$ .

Exercice 10 :

Déterminer le module et l'argument principal de chacun des nombres complexes suivants :

$z_1 = -1 + i$      $z_2 = i$      $z_3 = -2$      $z_4 = 2 - 2i\sqrt{3}$      $z_5 = 1 + \frac{1}{i}$ .

Exercice 11 : Déterminer le module et un argument de  $z = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}(i - 1)$ .

Exercice 12 : Soient  $z_1 = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$  et  $z_2 = -\sqrt{2} - \sqrt{2}i$  deux complexes conjugués.

Donner le module et un argument de chacun d'eux.

## II. D'une forme à l'autre

Exercice 13 : Mettre sous forme trigonométrique chacun des nombres complexes suivants :

$$5-5i, -1+i\sqrt{3}, -2i\sqrt{3}, 3+i\sqrt{3}, 2+\frac{2}{\sqrt{3}}i, -4\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right], \frac{\sqrt{6}}{1+i}, \frac{2}{1-i\sqrt{3}}, \frac{\sqrt{6}-i\sqrt{2}}{2}.$$

Exercice 14 :

Mettre chacun des nombres suivants sous forme trigonométrique, puis sous forme exponentielle :

$$z_1 = 1+i\sqrt{3} \quad z_2 = 2-2i \quad z_3 = -2i \quad z_4 = 3 \quad z_5 = -3+i\sqrt{3}.$$

Exercice 15 :

1. Mettre chacun des nombres suivants sous forme algébrique :

$$z_1 = 2(\cos \pi + i \sin \pi) \quad z_2 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \quad z_3 = \sqrt{3} \left( \cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right)$$

$$z_4 = \frac{1}{2}(\cos \theta + i \sin \theta) \quad z_5 = \frac{\sqrt{2}}{2} \left( \cos \left( -\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{2} \right) \right).$$

2. Les nombres suivants sont-ils sous forme trigonométrique ?

$$z_1 = -2(\cos \pi + i \sin \pi) \quad z_2 = \cos \frac{2\pi}{3} - i \sin \frac{2\pi}{3}.$$

Exercice 16 :

Mettre chacun des nombres suivants sous forme trigonométrique, puis sous forme algébrique :

$$z_1 = 4e^{i\frac{\pi}{2}} \quad z_2 = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} \quad z_3 = e^{-i\frac{3\pi}{4}} \quad z_4 = \sqrt{2}e^{i\pi} \quad z_5 = 3e^{-i\frac{\pi}{6}}.$$

Exercice 17 :

On considère les nombres complexes  $z_1 = 1+i$  et  $z_2 = 1-i\sqrt{3}$ .

1. Déterminer le module et un argument de  $z_1$  et  $z_2$ .

2. En déduire le module et un argument des nombres complexes suivants :  $\bar{z}_1, z_1 z_2, \frac{1}{z_2}, \frac{z_1}{z_2}, z_1^3$ .

## III. Application à la géométrie

Exercice 18 :

Soit  $A$  et  $B$  les points du plan d'affixes respectives  $z_A = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$  et  $z_B = \frac{\sqrt{3}+1}{2} - 2i$ .

Déterminer une mesure de l'angle  $(\vec{u}; \overline{AB})$ .

Exercice 19 :

Soit  $A, B$  et  $C$  les points du plan d'affixes respectives  $z_A = -1+i\sqrt{3}$  et  $z_B = -1-i\sqrt{3}$  et  $z_C = -2$ .

Déterminer une mesure de l'angle  $(\overline{CA}; \overline{CB})$ .

Exercice 20 :

Soit  $A, B, C$  et  $D$  les points du plan d'affixes respectives  $z_A = -i$  et  $z_B = 3, z_C = 2+3i$  et  $z_D = -1+2i$ .

Déterminer une mesure de l'angle  $(\overline{BD}; \overline{AC})$ .

Exercice 21 :

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct, on considère les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  d'affixes respectives  $z_A$ ,  $z_B$  et  $z_C$ .

Dans chacun des cas suivants :

1. Mettre le nombre complexe  $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$  sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique.

2. En déduire la nature du triangle  $ABC$ .

a)  $z_A = 2$     $z_B = 1 - 3i$     $z_C = -1 + i$

b)  $z_A = -1$     $z_B = 1$     $z_C = i\sqrt{3}$

c)  $z_A = 1 + \frac{3}{4}i$     $z_B = 2 - \frac{5}{4}i$     $z_C = 3 + \frac{7}{4}i$

d)  $z_A = \frac{1}{2} + i$     $z_B = \frac{3}{2} - i$     $z_C = 1 - \sqrt{3} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$